

六大名羊品种

圭山山羊, 2006年被列入国家畜禽遗传资源保护名录, 属肉乳兼用型山羊。

圭山山羊产区以石林县为中心, 自陆良、师宗边界沿普拉河延伸至弥勒县中部绵延两百多里的圭山山脉一带, 彝族支系撒尼民族聚居的石林、宜良、弥勒、泸西、陆良、师宗县均有分布。

圭山山羊抗逆性强, 发病少, 善于攀食灌木嫩叶枝芽, 耐粗饲能力强, 既产乳又产肉, 体质结实, 行动灵活, 游牧、定牧或舍饲均可, 为我省优良地方品种。但产乳量低, 生长发育慢, 成熟较晚。



母羊4岁（陈南凯摄）



公羊3岁（陈南凯摄）

龙陵黄山羊, 1987年列入《云南省家畜家禽品种志》, 属典型的肉用型山羊品种。

龙陵黄山羊主产于保山市的龙陵县, 与龙陵接壤的芒市的部分地区及腾冲县的蒲川乡亦有少量分布。

龙陵黄山羊具有肉质细嫩多汁、膻味小等特点, 其优点是生长发育速度快, 繁殖力强, 屠宰性能好, 适应性强, 杂交改良效果好。



公羊1.5岁（欧积能摄）



母羊2岁（欧积能摄）


云南半细毛羊, 2000年农业部第126号公告, 将其列为国家培育新品种, 成为我国第一个粗档半细毛羊新品种, 填补了我国无粗档半细毛羊新品种的空白, 由云南省畜牧兽医科学研究院等4个单位联合培育而成。

云南半细毛羊主产区为昭通市辖区内的中温带高二半山区和北温带高寒山区。

云南半细毛羊为毛肉兼用型羊, 体型外貌一致, 体质结构坚实, 性成熟早, 繁殖性能良好, 遗传性能稳定, 适应性强。其优点是产肉性和产毛性能优良, 尤其是所产半细羊毛, 毛丛结构良好, 弯曲一致, 主体细度为48~50支, 油汗白色乳白; 是毛纺工业纺织中粗绒线和高吸水波纹提花毯的优质原料, 也可代替土羊毛制作毡衣。经轻工业试纺鉴定, 羊毛细度均匀, 长度整齐, 综合品质评价达到新西兰羊毛, 光泽、强度超过新西兰羊毛, 成品纱支均匀, 手感好, 绒线肥胖度好, 用云南半细毛羊所生产的纯毛水纹提花毛毯, 水纹明显牢固, 手感丰厚, 有底绒, 光泽自然柔合, 色泽鲜艳, 保暖性强。缺点是适应性、抗病力与本地昭通绵羊相比稍差, 尤其是不宜在陡坡灌木林放牧。



公羊3岁（周达云摄）



母羊3岁（赵远崇摄）

—云南高原特色畜禽品种展示

六大名羊品种（续）

云岭山羊，曾用名云岭黑山羊、黑山羊，1987年列入《云南省家畜家禽品种志》，属肉皮兼用型山羊。

云岭山羊是云南省山羊中数量最多、分布最广的地方良种山羊。主产于云南境内云岭山系及其余脉的哀牢山、无量山和乌蒙山延伸地区，故通称为云岭山羊。

云岭山羊外貌清秀，被毛黑亮，毛色统一，具有优良的经济性状和早期肥育性好的特点。其优点是耐粗饲，耐旱耐贫瘠，适应性和抗病力强，善于攀高采食。肉质细嫩、蛋白质含量高、味鲜美，属无公害绿色食品；板皮厚、韧性好，皮革细腻，是制造皮鞋、皮衣等的上等原料。缺点是由于未进行系统选育，加之一度时期出现近亲繁殖，品种出现退化，个体较小且差异较大，生长速度慢，母羊产羔率和泌乳性能相对较低。



母羊2岁（李朝苍、施运科、姚金本摄）



公羊1.5岁（李朝苍、施运科、姚金本摄）

宁蒗黑绵羊，1987年列入《云南省家畜家禽品种志》，是毛肉兼用型的地方品种。2009年7月经国家畜禽遗传资源委员会鉴定通过，2010年1月15日农业部第1325号公告，将其列为国家畜禽遗传资源名录。

宁蒗黑绵羊主产于丽江市宁蒗县，主要分布在宁蒗县东南部及西南部的烂泥箐、新营盘、跑马坪、战河、蝉战河、西布河、西川等乡镇，县内其他乡镇均有分布。2005年末宁蒗黑绵羊存栏58 162只，占全县绵羊存栏总数的46%。

宁蒗黑绵羊具有遗传性能稳定，骨骼粗壮，体质结实，体格较大，体躯较长，行动敏捷，能耐高寒，耐粗饲，终年放牧，性情温驯，易饲养，产肉性能好，生长发育较快，性成熟早，繁殖率和繁殖成活率高的特点。缺点是产毛量低，全髓毛含量高。



母羊5岁（李国锋摄）



公羊6岁（李国锋摄）

罗平黄山羊，2010年农业部第1325号公告，将其列为国家畜禽遗传资源名录，属肉用型山羊。

罗平黄山羊的中心产区在罗平县的牛街（现称九龙）、长底、钟山、旧屋基一带，分布已覆盖罗平全县，相连富源县的十八连山乡也有适量分布。

罗平黄山羊体型较大，繁殖率高，具有抗逆性强，耐粗饲，易放牧，生长快，肌间脂肪含量高，肉质细嫩，味道鲜美等优点，是一个较好的肉用地方良种。但由于与本地黑山羊长期混杂，血缘不纯，需进一步提纯复壮。



母羊2.5岁（尤如华、邓德富、杜木森等摄）



公羊2岁（尤如华、邓德富、杜木森等摄）（钱宁刚供稿）